

İNTRAABDOMİNAL TORSİYONE TESTİS SEMİNOMU (OLGU SUNUMU)

İNTRAABDOMİNAL TORSION OF TESTICULAR SEMINOMA (CASE REPORT)

YİĞİT, B*., ÇARDAK, S*., ARAT, C*., ÇALIŞIR, V*., BALCI, M.B.C*., DİZDAROĞLU, F**.

ÖZET

İntraabdominal testis tümörlerinin torsiyonu oldukça nadir görülür ve çoğunlukla akut batın tablosuyla karşımıza çıkar. Bu çalışmada, laparotomi sırasında tanısı konulan iki torsiyone olmuş intraabdominal seminom olgusu sunuldu. Akut batın tablosuyla gelen ve ağrının saptandığı tarafta eğer testis skrotumda ya da inguinal kanalda palpe edilemiyorsa, intraabdominal testis veya testis tümörü torsiyonu olasılığı da düşünülmelidir.

SUMMARY

Torsion of the intraabdominal testicular tumors are rarely seen and most of them are easily misdiagnosed preoperatively. In this case report we are going to present two cases of torsion of the intraabdominal testicular seminomas which was evaluated as an acute abdomen preoperatively and diagnosis was made intraoperatively. These cases suggest that if the testis can not be found in scrotum and inguinal canal a patient with acute abdomen, we should think probability of intraabdominal torsion of the testis and/or testicular tumors and laparotomy should be done.

ANAHTAR KELİMELEER: Intraabdominal testis, torsiyon, seminom.

KEY WORDS: Intraabdominal testis, torsion, seminoma.

GİRİŞ

Testisin malign tümörleri relatif olarak nadirdir ve bunların %35'ini seminomlar oluşturur. Testis tümörlerinin %6'sının özgeçmişinde kriptorşidizm vardır ve inmemiş testisten çıkan tümörlerin de çoğunluğu seminomdur (1,2). Yine inmemiş testislerde torsiyon riski daha fazladır ve en sık adolesan çağda görülür. İntraabdominal yerleşimli testis torsiyonu ise nadir görülür ve genellikle preoperatif olarak tanısı konulamayan

bir akut karın şeklinde karşımıza çıkabilir (3).

Bu çalışmada, nadir görülen ve akut batın tablosuyla hastanemize başvuran iki intraabdominal yerleşimli torsiyone olmuş seminom olgusu sunularak literatür gözden geçirildi.

Olgu 1: E.K. (Prot.no: 6594). 19 yaşında erkek hasta. Sağ alt kadranda, şiddeti giderek artan ağrı ve bulantı şikayetleri ile acil cerrahi polikliniğine başvurdu. Fizik muyaenede, sağ alt kad-

* Taksim Hastanesi Üroloji Kliniği

** Çapa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

KAYNAKLAR

- 1) **Johnson, D.E., Swanson, D.A., Eschenbach, A.C.:** Tumors of the Genitourinary Tract. Smith's General Urology (Tanagho, E.A., Mc Aninch, J.W.) 12. Edition Appleton and Lange, 385-394, 1988.
- 2) **Batata, M.A. et al.:** Testicular Cancer in Cryptorchidism. Cancer; 49: 1023-1030, 1982.
- 3) **Rajfer, J.:** Congenital anomalies of the testis. Campbell's Urology (Walsh, P.C., Gittes, R.F., Perlmutter, A.D., Stamey, T.A.: ed.) Fifth edition. Philadelphia, Saunders, 2: 1947 - 1964, 1986.
- 4) **Rigler, H.C.:** Torsion of intraabdominal testes, An unusual problem in diagnosis of the acute abdomen. Surg. Clin. North. Am., 52: 371-374, 1982.
- 5) **Ein, S.H.:** Torsion of an undescended intraabdominal benign testicular teratoma. J.Ped. Surg. 22: 799-801, 1987.
- 6) **Frank, R.G. et al.:** Torsion of an intraabdominal testicular tumor presenting as an acute abdomen. Urol. Rad. 12: 50 - 2, 1990.
- 7) **Walker, R.D.:** Diagnosis and management of the nonpalpable undescended testicle. AUA update Series, Lesson 20 Vol: XI, 1992.